

NET

NEues Theresienfeld

ERSTE HILFE KURS für HAUSTIERE

Mag. Rosa Sasarman

Mag. Nina Zöger



Inhalt

- Atemnot
- Bewusstlosigkeit
- Hitzeschlag
- Verbrennung
- Innere Verletzungen
- Äußere Verletzungen
- Knochenbrüche



Atemnot / Insektenstich I

Anzeichen

- permanentes Würgen
- blaue Zunge (blasse Schleimhaut)
- gestreckter Hals
- offenes Maul & aufgerissene Augen
- Versuch mit den Pfoten ins Maul zu „greifen“



Atemnot / Insektenstich II

Hilfe

- Maul öffnen !!Vorsicht auf die Finger!!
Hilfsmittel verwenden!
- Auf die rechte Seite legen, falls Katze bewusstlos
- vom Brustbein Richtung Hals massieren
- sanft gegen Brustbein klopfen



Atemnot / Insektenstich III

Wichtig!!

- keine Fremdkörper zurück in den Hals schieben
Entfernung nicht möglich, sofort Tierarzt aufsuchen
- Insektenstich: kühlen und Katze beruhigen



Bewusstlosigkeit I

Atemwege sichern (wie vorher erwähnt)

Beatmen

→ Katze auf rechte Seite legen

→ Beatmen über die Nase

20-30 mal pro Minute (alle 2 bis 3 Sekunden)

Puls fühlen am Innenschenkel

Circulation

→ Herzmassage (10 mal), dann wieder Beatmung

→ Herzschlag fühlen



Vitalparameter

- Atemfrequenz 20-40 Atemzüge pro Minute
- Herzfrequenz 100-160 Schläge pro Minute
- Körpertemperatur 38-39,2 °C
- Kapillarfüllungszeit Schleimhaut sollte immer rosa sein
 - auf Lippe drücken
 - Schleimhaut sollte nach 2-3s rosa werden
- Flüssigkeitshaushalt Nacken/Hautfalte muss sofort wieder verstreichen



Hitzeschlag / Überhitzung I

Anzeichen

- Apathie
- Bauchlage
- Hecheln / Speicheln



Hitzeschlag / Überhitzung II

Hilfe

- Rechte Seitenlage & Kühlen!!
 - Nicht mit Wasser überschütten (Schockgefahr)
 - Mit feuchten Tüchern kühlen, erst die Pfoten dann Brustkorb
- Zunge mit Wasser befeuchten
 - Wasser nicht direkt einflößen (Aspirationsgefahr)



Verbrennungen I

Ursachen

- Herdplatte
- Wasserdampf
- Kerze (Weihnachten,...)



Verbrennungen II

Anzeichen

- Wunden an Pfoten oder Schnauze (seltener am Körper)
- Rötungen
- offene Wunden, Bläschen, Haarausfall



Verbrennungen III

Hilfe

- Kühlen mit Tüchern
- Wundsalben (☹️ Achtung: Katzen mögen das nicht☹️!!)
- Tierarzt aufsuchen



Innere Verletzungen I

Ursachen

- Stürze
- Tritte
- Bisse (meistens durch Hunde)
- Quetschung im Kippfenster



Innere Verletzungen II

Anzeichen

- oft nicht unmittelbar erkennbar
- Apathie, Fressunlust
- blutiger Kot oder Harn
- Erbrechen
- Achtung: Bisse sind nicht immer von außen sichtbar



Innere Verletzungen III

Kippfenster (sehr häufig)

- meist Nierenquetschungen
- Fressunlust, Erbrechen, blutiger/kein Harn
- Schmerzen im Rückenbereich

- IMMER Tierarzt aufsuchen!!!



Äußere Verletzungen I

Ursachen

- Bisse
- Schnittwunden
- Stichwunden (zB Äste,...)
- Schusswunden



Äußere Verletzungen II

Hilfe

- Blutende Wunde - Druckverband
- oberflächliche Wunden - Wundpflege und Verband
- tiefe Wunden - Tierarzt aufsuchen Infektionsgefahr!!!
- Bisse - Tierarzt empfohlen Infektionsgefahr!!!
- Stichwunde/Schusswunde - Tierarzt aufsuchen Infektion!!!



Knochenbrüche / Pfotenverletzung I

Anzeichen

- Leichte bis schwere Lahmheit
- Leichte bis starke Schwellung
- Instabile Extremität



Knochenbrüche / Pfotenverletzung II

Ursachen

- Verstauchung, Prellung, Zerrung (meistens)
- Fraktur / Knochenbruch (eher selten)
- Biss oder Fremdkörper



Knochenbrüche / Pfotenverletzung III

Was tun?

- Lahmheit und Schwellung wird nach 1-2 Tagen besser
Meistens Verstauchung/Prellung/Zerrung
Keine weiteren Maßnahmen notwendig
- Lahmheit und Schwellung wird nicht besser oder schlechter
Biss/Fremdkörper - Tierarzt aufsuchen
- Extremität instabil / Katze belastet Pfote nicht
Fraktur/Bruch- Tierarzt aufsuchen



**VIELEN DANK FÜR
IHRE
AUFMERKSAMKEIT!**

Mag. Rosa Sasarman

Mag. Nina Zöger

